

Acetocaustin®

Wrattenmiddel

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING GOED DOOR VOORDAT U ACETOCAUSTIN WRATTENMIDDEL GEBRUIKT, ZELFS ALS U HET PRODUCT AL EERDER HEBT GEBRUIKT. DE INFORMATIE KAN ZIJN GEWIJZIGD OP BASIS VAN NIEUWE ONDERZOEKEN EN BEVINDINGEN IN DE TIJD SINDS U HET PRODUCT VOOR HET LAATST HEBT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZODAT U HEM ZO NODIG LATER NOG EENS KUNT RAADPLEGEN. VOOR VOLWASSENEN EN KINDEREN (VANAF 4 JAAR)

WAARVOOR WORDT ACETOCAUSTIN WRATTENMIDDEL GEBRUIKT?

Acetocaustin wrattenmiddel is een medisch hulpmiddel voor de behandeling van gewone wratten. Acetocaustin wrattenmiddel bevat monochloorazijnzuur, een stof die een keratolytisch effect heeft op de huid. Dit betekent dat de wrat laagje voor laagje zal oplossen. Monochloorazijnzuur zorgt ervoor dat de cellen die het wratvirus bevatten worden vernietigd.

Het voordeel van het gebruik van Acetocaustin wrattenmiddel is dat het direct op de wrat aanbrengen geen pijn doet, waardoor het ook geschikt is voor kinderen indien op de juiste manier door een volwassene aangebracht.

Acetocaustin wrattenmiddel kan alleen worden toegepast op gewone wratten:

- Komen voornamelijk voor op handen en voeten
- Hebben dezelfde kleur als de huid
- Omtrent varieert van minder dan een millimeter tot meer dan een centimeter
- Er komen meestal meerdere wratten tegelijkertijd voor
- Besmetting komt vaak voor door direct contact, maar ook via handdoeken of besmette oppervlakken
- Krabben en nagelbijten verhogen het risico van besmetting



Gebruik Acetocaustin wrattenmiddel niet op ouderdomswratten

- Kunnen in verschillende afmetingen en kleuren voorkomen
- Gemiddelde omtrek is 0,5 tot 1 cm
- Beginnen vaak als een huidkleurige, geelbruine, grijsbruine vlek – later worden ze groter en dikker
- Ze zien eruit alsof ze op het huidoppervlak liggen en gemakkelijk weggekrabd kunnen worden, maar ze zitten stevig vast aan de huid
- Ze kunnen overal op het lichaam voorkomen, behalve op de handpalmen, voetzolen en lippen. Komen het meest voor op de borst, de rug, het gezicht en de nek



Voet wratten (verruca plantaris)

- Vind je aan de onderkant/zoom van je voet;
- Meestal plat en omgeven door ruwe, verdikte huid;
- Lijkt op eelt;
- Kan zwarte stippen of kleine zaadjes bevatten;

Gebruiksaanwijzing (voorkom brandwonden):

WEL DOEN:

- Aanbrengen door volwassenen;
- Alleen gebruiken op handen en voeten! Niet gebruiken op andere lichaamsdelen;
- Wrijf de huid eromheen in met vaseline of zinkzalf om de huid te beschermen;
- Plaats de fles op een stevige ondergrond die bestand is tegen de bijtende vloeistof;
- Dep de wrat/verruca niet meer dan één keer bij het aanbrengen;
- Dep de wrat slechts één keer per week;
- Laat de vloeistof alleen in contact komen met de wrat/verruca;
- Vermijd contact met de huid;
- Laat de vloeistof na het aanbrengen goed drogen;
- Laat de wrat/verruca onbedekt;
- Het resultaat is na 1 week zichtbaar;
- Buiten bereik van kinderen bewaren.



NIET DOEN:

- Aanbrengen door personen jonger dan 18 jaar;
- Aanbrengen op wratten/verruca's op lichaamsdelen anders dan handen of voeten;
- Aanbrengen op een wrat die geheel of gedeeltelijk onder een nagel zit;
- **Aanbrengen op wratten die geheel of gedeeltelijk op de voetzool voorkomen (plantaire wratten);**
- De vloeistof in contact laten komen met een gezonde huid;
- Aanbrengen met trillende handen of stijve vingers;
- De wrat meer dan één keer deppen bij het aanbrengen;
- De wrat/verruca bedekken na het aanbrengen van de vloeistof;
- **Aanbrengen op moedervlekken, waterwratten, open wonden, hyperpigmentatie, seniele wratten, plantaire wratten, donkergekleurde harige of vreemd uitzijende wratten;**
- Aanbrengen tijdens de zwangerschap of bij vrouwen die borstvoeding geven.
- De behandeling herhalen voordat één week is verstreken.



WAARSCHUWINGEN

Gebruik Acetocaustin wrattenmiddel niet:

- Bij kinderen jonger dan 4 jaar
- indien u allergisch bent voor een of meer van de bestanddelen.
- In het gezicht (de vloeistof mag nooit in contact komen met de ogen of de slijmvliezen van de neus of mond)
- Voor genitale wratten of in het genitale gebied
- **Op moedervlekken, molluscum contagiosum, open wonden, moedervlekken, naevus, seniele (bruine) wratten, plantaire wratten, donker gekleurde, harige of vreemd uitzijende wratten.**
- Op rode, geïrriteerde of geïnfecteerde wratten
- Onmiddellijk na een chirurgische verwijdering van wratten, bevriezing van de wrat (cryotherapie) of een laserbehandeling. Dit geldt vooral als de huid rood of pijnlijk is na de behandeling. In dit geval moet u minstens 4 weken wachten totdat de roodheid of ontsteking van de huid volledig is verdwenen. Pas dan kunt u weer beginnen met het gebruik van Acetocaustin wrattenmiddel.
- Tijdens de zwangerschap of als u borstvoeding geeft
- Op wratten die zich geheel of gedeeltelijk onder de nagel bevinden
- Dep de wrat niet meer dan één keer en herhaal dit alleen indien nodig na een tussenpauze van een week.
- **Niet gebruiken op wratten die geheel of gedeeltelijk op de voetzool voorkomen (plantaire wratten).**

Wees extra voorzichtig bij het gebruik van Acetocaustin wrattenmiddel:

- Bij twijfel over de diagnose (als de verandering in de huid niet duidelijk als wrat kan worden verklaard)
- In geval van immuundeficiëntie (bijv. als u cytostatica gebruikt)
- Bij diabetes of andere aandoeningen, zoals vaatziekten, waardoor wonden minder snel genezen.

In deze gevallen mag u Acetocaustin wrattenmiddel niet gebruiken voordat een arts is geraadpleegd

WAARSCHUWINGEN

- Alleen bedoeld voor uitwendig gebruik
- Gebruik met uiterste voorzichtigheid. De vloeistof van Acetocaustin wrattenmiddel is bijtend
- Als gezonde huid in contact komt met de vloeistof, spoel deze dan af met water. Als de huid ondanks deze voorzorgsmaatregelen geïrriteerd raakt, moet dezelfde behandeling worden toegepast als bij een brandwond
- Neem contact op met uw arts als uw klachten niet verminderen
- Sluit de fles na gebruik goed af en bewaar hem rechtop
- Buiten bereik van jonge kinderen bewaren
- Gebruik door kinderen, ouderen en mindervaliden moet onder toezicht van een volwassene gebeuren.
- Vermijd contact met kleding, textiel, tafelkleden of huid
- Stop het gebruik als blaren ontstaan
- Dep de wrat niet meer dan één keer en herhaal dit alleen indien nodig na een tussenpauze van een week

BIJWERKINGEN

Acetocaustin wrattenmiddel kan bijwerkingen veroorzaken, maar niet iedereen zal deze ervaren. De bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Acetocaustin wrattenmiddel zijn een geïrriteerde huid, een branderig gevoel, rode huid of overgevoelighedsreacties. Als een van deze bijwerkingen ernstig wordt of als u een bijwerking opmerkt die niet in deze gebruiksaanwijzing staat, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

INTERACTIE MET MEDICIJNEN

Voor zover wij weten, zijn er geen interacties met andere medicijnen.

INHOUD VAN ACETOCAUSTIN WRATTENMIDDEL

Een flesje gevuld met 2 ml van een mengsel van monochloorazijnzuur (50%) en gezuiverd water (50%). Er wordt een speciale applicator gebruikt om het middel op de wrat aan te brengen.

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Bewaar Acetocaustin wrattenmiddel bij een temperatuur van 15-25 °C, op een droge en donkere plaats in de oorspronkelijke verpakking en buiten bereik van jonge kinderen.



De houdbaarheidsdatum staat onder op de verpakking. Na opening niet langer dan 4 weken gebruiken.

Ga voor meer informatie over Acetocaustin wrattenmiddel naar www.acetocaustin.com. Neem voor alle productaanvragen contact op met de distributeur.

MEDISCH HULPMIDDEL:

Acetocaustin wrattenmiddel is een medisch hulpmiddel van klasse IIa volgens Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.

UITLEG VAN SYMBOLEN

De waarschuwingstekens en symbolen op de verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn essentieel om ervoor te zorgen dat u dit product veilig en correct gebruikt en om u en anderen te beschermen tegen letsel. De symbolen worden in de onderstaande tabel uitgelegd:

Symbol	Uitleg
	Symbol voor de fabrikant
	Symbol dat aangeeft dat de gebruiksaanwijzing moet worden geraadpleegd
	Symbol dat aangeeft dat voorzichtigheid is geboden bij gebruik van het hulpmiddel
	Symbol voor de houdbaarheidsdatum
	Symbol dat aangeeft dat het artikel een medisch hulpmiddel is
	Waarschuwing: Bijtende stof
	Niet voor kinderen jonger dan drie jaar
	Buiten het bereik van kinderen bewaren
	Niet voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
	Symbol voor het partijnummer
	Het product moet worden bewaard tussen 15 °C en 25 °C

HOE WORDT ACETOCAUSTIN WRATTENMIDDEL GEBRUIKT?

(AANBRENGEN ALLEEN DOOR VOLWASSENEN):

Breng Acetocaustin wrattenmiddel met de grootste zorg aan.

De oplossing is bijtend. Wees extra voorzichtig bij het aanbrengen op delen van handen en voeten die moeilijker te bereiken zijn. Dit geldt vooral voor personen met een beperkte mobiliteit of bij een verstoorde fijne motoriek (trillende handen, stijve vingers).



1. Acetocaustin wrattenmiddel heeft een kindveilige dop die als volgt geopend kan worden: Plaats de fles op een stevige ondergrond die bestand is tegen de bijtende vloeistof. Vermijd contact met kleding, textiel en tafelkleden. U kunt de flacon openen door de dop in te drukken en tegelijkertijd tegen de klok in te draaien.
2. Breng royaal vaseline of zinkzalf aan op de gezonde huid rondom de wrat voordat u de dop van de flacon haalt.
3. Verwijder de dop van de flacon.
4. Breng vervolgens met de spatel een kleine hoeveelheid Acetocaustin wrattenmiddel aan op de wrat (zorg ervoor dat de vloeistof niet van de spatel afdruipt). Zorg dat u Acetocaustin wrattenmiddel alleen op de wrat aanbrengt en niet meer dan één keer de wrat dept.
5. Laat het even opdrogen en dek de wrat niet af. Sluit de fles voorzichtig na gebruik. Acetocaustin wrattenmiddel mag niet vaker dan één keer per week worden aangebracht.

De vloeistof heeft een week nodig om de bovenste laag van de wrat op te lossen, dus u zult niet meteen resultaat zien na het aanbrengen. Afhankelijk van de grootte en dikte van de wrat kan het nodig zijn om de behandeling met Acetocaustin wrattenmiddel na een week te herhalen. Herhaal de behandeling niet met een tussenpauze korter dan één week.



Breng uitsluitend aan op gewone wratten op handen en voeten



FABRIKANT
PK Benelux B.V.
Vluchtoord 17
5406 XP Uden
Nederland

DISTRIBUTEUR
TheOTClab
Fred.Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
Nederland

Acetocaustin®

Traitement acide

LISEZ ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER LE TRAITEMENT ACIDE DES VERRUES ACETOCAUSTIN, MÊME SI VOUS AVEZ DÉJÀ UTILISÉ LE PRODUIT AUPARAVANT. LES INFORMATIONS PEUVENT AVOIR ÉTÉ MODIFIÉES EN FONCTION DE NOUVELLES RECHERCHES ET DÉCOUVERTES DEPUIS QUE VOUS AVEZ OUVERT VOTRE DERNIÈRE BOÎTE. CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI AU CAS OÙ VOUS AURIEZ BESOIN DE LE CONSULTER À NOUVEAU. POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS (À PARTIR DE 4 ANS)

DANS QUEL CAS UTILISER LE TRAITEMENT ACIDE DES VERRUES ACETOCAUSTIN ?

Le traitement acide des verrues Acetocaustin est un dispositif médical destiné au traitement des verrues communes. Le traitement acide des verrues Acetocaustin contient de l'acide monochloracétique, une substance qui a un effet kératolytique sur la peau. La verrue se dissout couche par couche. L'acide monochloracétique assure la destruction des cellules contenant le virus de la verrue. L'avantage du traitement acide des verrues Acetocaustin est qu'une application directement sur la verrue n'est pas douloureuse, ce qui signifie qu'il peut également être utilisé chez les enfants, s'il est correctement appliqué par un adulte.

Le traitement acide des verrues Acetocaustin convient uniquement aux verrues communes :

- Elles apparaissent principalement sur les mains et les pieds
- Elles ont la même couleur que la peau
- Leur circonférence varie de moins d'un millimètre à plus d'un centimètre
- Plusieurs verrues apparaissent généralement en même temps
- La contamination se produit souvent par contact direct, mais aussi par l'intermédiaire de serviettes ou de surfaces infectées
- Se gratter et se ronger les ongles augmente le risque de contamination



N'utilisez pas le traitement acide des verrues Acetocaustin sur les verrues séborrhéiques

- Elles se présentent sous différentes tailles et couleurs
- Leur circonférence moyenne est de 0,5 à 1 cm
- Elles commencent souvent par une tache de couleur chair, jaune-brun ou gris-brun. Plus tard, elles deviennent plus grandes et plus grasses
- Elles donnent l'impression d'être à la surface de la peau et faciles à enlever en grattant, mais elles sont en fait fermement attachées à la peau
- Elles peuvent apparaître n'importe où sur le corps, à l'exception de la paume des mains et de la plante des pieds, ainsi que sur les lèvres. Elles apparaissent la plupart du temps sur la poitrine, le dos, le visage, et le cou



Verrue plantaire (verruca plantaris)

- Se trouve sous la plante du pied ;
- Généralement plate et entourée d'une peau rugueuse et épaissie ;
- Ressemblent à des callosités ;
- Peut contenir des points noirs ou de minuscules graines ;



Mode d'emploi (prévention des brûlures) :

À FAIRE :

- Application par un adulte ;
- Utiliser uniquement sur les mains et les pieds ! Ne pas utiliser sur d'autres parties du corps ;
- Enduire la peau environnante de vaseline ou d'une pommade à base de zinc pour la protéger ;
- Placer le flacon sur un support solide capable de résister au liquide caustique ;
- Tamponner la verrue une seule fois lors de l'application ;
- Tamponner la verrue seulement une fois par semaine ;
- Veiller à ce que le liquide entre uniquement en contact avec la verrue ;
- Éviter le contact avec la peau ;
- Laisser le liquide sécher complètement après l'application ;
- Ne pas couvrir la verrue ;
- Le résultat est visible après 1 semaine ;
- Tenir hors de portée des enfants.



À NE PAS FAIRE :

- Laisser des personnes de moins de 18 ans appliquer le produit ;
- Appliquer sur une verrue se trouvant sur une partie du corps autre que les mains et les pieds ;
- Appliquer sur toute verrue se trouvant en totalité ou en partie sous un ongle ;
- Appliquer sur les verrues apparaissant entièrement ou partiellement sur la plante du pied (verrues plantaires) ;
- Appliquer lorsque vos mains tremblent ou que vos doigts sont raides ;
- Tamponner la verrue plusieurs fois au moment de l'application ;
- Couvrir la verrue après avoir appliqué le liquide ;
- Appliquer sur les taches de naissance, les naevus, les verrues séniles (brunes), les taches de naissance, les verrues de couleur foncée, les poils ou d'aspect étrange ;
- Appliquer pendant la grossesse ou l'allaitement.
- Répéter le traitement sans attendre un intervalle d'une semaine.



PRÉCAUTIONS

N'utilisez pas le traitement acide des verrues Acetocaustin :

- Chez les enfants de moins de 4 ans
- N'utilisez pas le produit :
- Si vous êtes sensible à un ou plusieurs des ingrédients.
- Sur le visage (le liquide ne doit jamais entrer en contact avec les yeux ou les muqueuses du nez ou de la bouche)
- Sur les verrues génitales ou situées dans la région génitale
- Sur les taches de naissance, le molluscum contagiosum, les plaies ouvertes, les taches de naissance, les naevus, les verrues séniles (brunes), les verrues plantaires, les verrues de couleur foncée, poils ou d'aspect étrange.
- Sur les verrues rouges, irritées ou infectées
- Immédiatement après une ablation chirurgicale de verrue(s), une congélation de verrue(s) (cryothérapie) ou un traitement au laser. Cela s'applique particulièrement lorsque la peau est rouge ou douloureuse après le traitement. Dans ce cas, vous devrez attendre au moins 4 semaines, jusqu'à ce que la rougeur ou l'inflammation de la peau ait complètement disparu. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez recommencer à utiliser le traitement acide des verrues Acetocaustin
- Pendant la grossesse ou l'allaitement
- N'utilisez pas le produit sur les verrues qui apparaissent entièrement ou partiellement sous un ongle
- Ne tamponnez pas la verrue plus d'une fois et ne répétez que si nécessaire après un intervalle d'une semaine.
- Ne pas utiliser sur les verrues situées entièrement ou partiellement sur la plante du pied (verrues plantaires).

Faites particulièrement attention lorsque vous utilisez le traitement acide des verrues Acetocaustin :

- En cas de doute sur le diagnostic (le changement de l'aspect de la peau ne peut pas être clairement identifié comme une verrue)
- En cas d'immunodéficience (par exemple en cas d'utilisation de médicaments cytostatiques)
- En cas de diabète ou d'autres affections telles que les maladies vasculaires, à cause desquelles les plaies cicatrisent moins facilement.

Dans ces cas, vous ne pouvez pas utiliser le traitement acide des verrues Acetocaustin sans l'accord d'un médecin

AVERTISSEMENTS

- Pour usage externe seulement
- Utilisez avec la plus grande prudence. Le liquide du traitement acide des verrues Acetocaustin est corrosif
- Si la peau saine entre en contact avec le produit, veuillez la rincer à l'eau. Si, malgré ces précautions, la peau devient irritée, elle devra subir le même traitement que les brûlures
- Contactez votre médecin si vos troubles ne s'estompent pas
- Refermez correctement le flacon après utilisation et rangez-le en position verticale
- Tenez hors de portée des jeunes enfants
- L'utilisation par les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite doit être supervisée par un adulte.
- Évitez le contact avec les vêtements, les textiles, les nappes ou la peau
- Cessez l'utilisation en cas d'apparition de cloques
- Ne tamponnez pas la verrue plus d'une fois et ne répétez que si nécessaire après un intervalle d'une semaine

EFFETS SECONDAIRES

Le traitement acide des verrues Acetocaustin peut provoquer des effets secondaires, bien que tout le monde n'en souffre pas. Les effets secondaires pouvant découler de l'utilisation du traitement acide des verrues Acetocaustin sont une irritation de la peau, une sensation de brûlure, une rougeur de la peau ou des réactions d'hypersensibilité. Si l'un de ces effets secondaires devient grave ou si vous remarquez des effets secondaires non mentionnés dans ce mode d'emploi, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

À notre connaissance, il n'y a pas d'interactions avec d'autres médicaments.

CONTENU DU TRAITEMENT ACIDE DES VERRUES ACETOCAUSTIN

Un flacon contenant 2 ml d'un mélange d'acide monochloracétique (50 %) et d'eau purifiée (50 %). Un applicateur sur mesure est utilisé pour appliquer la formulation sur la verrue.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conservez le traitement acide des verrues Acetocaustin à une température comprise entre 15 et 25 °C, dans un endroit sec à l'abri de la lumière, dans l'emballage d'origine et hors de portée des jeunes enfants.



La date de péremption est indiquée au bas de l'emballage. Après ouverture, n'utilisez pas le traitement plus de 4 semaines.

Pour plus d'informations sur le traitement acide des verrues Acetocaustin, visitez le site www.acetocaustin.com. Pour toute demande de renseignements sur les produits, veuillez contacter le distributeur.

DISPOSITIF MÉDICAL :

Le traitement acide des verrues Acetocaustin est un dispositif médical de classe IIa conformément à la directive 93/42/CEE.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Les signes et symboles d'avertissement figurant sur l'emballage et le mode d'emploi sont essentiels pour garantir que vous utilisez ce produit correctement et en toute sécurité et pour vous protéger, vous et les autres, contre les blessures. Les symboles sont expliqués dans le tableau ci-dessous :

Symbole	Explication
	Symbole du fabricant
	Symbole indiquant de consulter le mode d'emploi
	Symbole indiquant qu'il faut être prudent lors de l'utilisation du produit
	Symbole de la date d'expiration
	Symbole indiquant que l'article est un dispositif médical
	Avertissement : substance corrosive
	Ne convient pas aux enfants de 3 ans ou moins
	Tenir hors de portée des enfants
	Ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent
	Symbole du numéro de lot
	Le produit doit être conservé entre 15 °C et 25 °C


COMMENT UTILISER LE TRAITEMENT ACIDE DES VERRUES ACETOCAUSTIN ? (APPLICATION PAR DES ADULTES UNIQUEMENT) :

Veillez à appliquer le traitement acide des verrues Acetocaustin avec la plus grande prudence. La solution est caustique. Faites particulièrement attention lorsque vous appliquez le produit sur des parties des mains ou des pieds plus difficiles à atteindre. Ceci s'applique particulièrement aux personnes à mobilité réduite ou en cas de troubles de la motricité fine du système (mains tremblantes, doigts raides).



- Le traitement acide des verrues Acetocaustin a un bouchon équipé d'une sécurité pour enfants et peut être ouvert comme suit : Placez le flacon sur un support solide capable de résister au liquide caustique. Évitez le contact avec les vêtements, les textiles ou les nappes. Vous pouvez ouvrir le flacon en appuyant sur le bouchon et en le tournant simultanément dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Avant de retirer complètement le bouchon du flacon, appliquez généreusement de la vaseline ou une pommade à base de zinc sur la peau saine entourant la verrue.
- Retirez le bouchon du flacon.
- Appliquez ensuite une petite quantité du traitement acide des verrues Acetocaustin sur la verrue à l'aide de la spatule (ne laissez pas le liquide couler). Veillez à n'appliquer le traitement acide des verrues Acetocaustin que sur la verrue et à ne pas la tamponner plus d'une fois.
- Laissez sécher quelques instants et ne couvrez pas la verrue. Refermez soigneusement le flacon après utilisation. Le traitement acide des verrues Acetocaustin ne doit pas être appliqué plus d'une fois par semaine.

Le liquide a besoin d'une semaine pour dissoudre la couche supérieure de la verrue. Vous ne verrez donc pas de résultat immédiat après l'application. En fonction de la taille et de l'épaisseur de la verrue, il peut être nécessaire de répéter le traitement acide des verrues Acetocaustin après une semaine. Ne répétez pas le traitement à moins d'une semaine d'intervalle.



FABRICANT
PK Benelux B.V.
Vluchttoord 17
5406 XP Uden
Pays-Bas

DISTRIBUTEUR
TheOTClab
Fred.Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
Pays-Bas

Acetocaustin®

Wartzenmittel

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DES DR. YGLO WARZENMITTELS DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH, AUCH WENN SIE DAS PRODUKT SCHON EINMAL VERWENDET HABEN. DIE INFORMATIONEN KÖNNEN SICH AUFGRUND NEUER STUDIEN UND ERKENNTNISSE GEÄNDERT HABEN, SEITDEM SIE DAS PRODUKT LETZTMALS VERWENDET HABEN. BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. FÜR ERWACHSENE UND KINDER (AB 4 JAHREN)

WOZU WIRD DAS DR. YGLO WARZENMITTEL ANGEWANDT?
Das Dr. Yglo Warzenmittel ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von gewöhnlichen Warzen. Das Dr. Yglo Warzenmittel enthält Monochloressigsäure, eine Substanz, die eine hornlösende (keratolytische) Wirkung auf die Haut hat. Sie löst die Warze Schicht für Schicht auf. Die Monochloressigsäure zerstört die Zellen, die das Warzenvirus enthalten. Der Vorteil des Dr. Yglo Warzenmittels besteht darin, dass sie schmerzfrei direkt auf die Warze aufgetragen werden kann, wodurch sie bei einer korrekten Anwendung durch einen Erwachsenen auch für Kinder geeignet ist.

Dr. Yglo Warzenmittel ist nur zur Behandlung gewöhnlicher Warzen vorgesehen:

- Treten vor allem an Händen und Füßen auf
- Gleiche Farbe wie die Haut
- Umfang variiert zwischen weniger als einem Millimeter und mehr als einem Zentimeter
- Meist bilden sich mehrere Warzen gleichzeitig
- Die Kontamination erfolgt häufig durch direkten Kontakt, aber auch durch Handtücher oder kontaminierte Oberflächen
- Kratzen und Nägelkauen erhöhen das Risiko einer Infektion



Verwenden Sie das Dr. Yglo Warzenmittel NICHT bei Alterswarzen

- Können in verschiedenen Größen und Farben auftreten
- Durchschnittlicher Umfang zwischen 0,5 und 1 cm
- Zu Beginn oft als hautfarbene, gelbbraune oder graubraune Flecken zu erkennen. Später werden sie größer und dicker
- Sie sehen aus, als lägen sie auf der Hautoberfläche und ließen sich leicht abkratzen, sind aber tatsächlich fest mit der Haut verbunden
- Sie können überall am Körper auftreten, außer an den Handflächen und Fußsohlen sowie an den Lippen. Am wahrscheinlichsten treten sie auf der Brust, dem Rücken und dem Gesicht sowie dem Hals auf



NICHT bei Dornwarzen (verruca plantaris)

- Entstehen meist auf der Unterseite des Fußes/Fußsohle;
- Üblicherweise flach und umgeben von harter, verdickter Haut;
- Ähneln einem Hühnerauge;
- Können kleine schwarze Punkte entalten;



Gebrauchsanweisung (Verbrennungen vorbeugen):

VORGEHENSWEISE:

- Auftragung durch Erwachsene;
- Nur an Händen und Füßen verwenden! Das Produkt nicht auf anderen Körperteilen anwenden;
- Die umliegende Haut mit Vaseline oder Zinksalbe einreiben, um die Haut zu schützen;
- Die Flasche auf einen festen Untergrund stellen, der gegen die ätzende Flüssigkeit beständig ist.
- Die Warze/Verruca beim Auftragen nur einmal abtupfen;
- Die Warze nur einmal pro Woche abtupfen;
- Die Flüssigkeit nur mit der Warze/Verruca in Kontakt kommen lassen;
- Den Kontakt mit gesunder Haut vermeiden;
- Die Flüssigkeit nach dem Auftragen gut trocknen lassen;
- Die Warze/Verruca unbedeckt lassen;
- Das Ergebnis ist nach 1 Woche sichtbar;
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



VERMEIDEN SIE FOLGENDES:

- Auftragung von Menschen unter 18 Jahren;
- Das Produkt auf Warzen/Verrucas an allen Körperteilen außer an Händen und Füßen auftragen;
- Auf jede Warze auftragen, die sich ganz oder teilweise unter einem Nagel befindet;
- Nicht anwenden bei Warzen, die ganz oder teilweise an der Fußsohle auftreten (Plantarwarzen);**
- Die Flüssigkeit mit der gesunden Haut in Kontakt kommen lassen;
- Auftragen, wenn Ihre Hände zittern oder Ihre Finger steif sind;
- Die Warze bei der Anwendung mehr als einmal abtupfen;
- Die Warze/Verruca nach dem Auftragen der Flüssigkeit abdecken;
- Anwendung auf Muttermalen, Wasserwarzen, offenen Wunden, Hyperpigmentierung, Alterswarzen, Dornwarzen, dunklen, behaarten oder abnormal aussehenden Warzen.**
- Anwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit.
- Wiederholen der Behandlung in einem kürzeren Abstand als einmal die Woche.



⚠️ WARNUNGEN

Verwenden Sie das Dr. Yglo Warzenmittel nicht:

- Bei Kindern unter 4 Jahren
- Wenn Sie empfindlich auf einen oder mehrere der Inhaltsstoffe reagieren. Verwenden Sie die Flüssigkeit niemals im Gesicht (die Flüssigkeit darf niemals mit den Augen sowie Nasen- und Mundschleimhäuten in Berührung kommen)
- Für Genitalwarzen oder im Genitalbereich
- Auf Muttermalen, molluscum contagiosum, offenen Wunden, Leberflecken, Nävi, braunen Alterswarzen, dunklen, behaarten oder abnormal aussehenden Warzen.**
- Bei roten, gereizten oder infizierten Warzen
- Unmittelbar nach einer chirurgischen Entfernung von Warzen, dem Einfrieren der Warze (Kryotherapie) oder einer Laserbehandlung. Dies gilt insbesondere, wenn die Haut nach der Behandlung gerötet ist oder schmerzt. Warten Sie in diesem Fall mindestens 4 Wochen, bis die Rötung oder Entzündung der Haut vollständig verschwunden ist. Erst dann können Sie das Dr. Yglo Warzenmittel wieder nutzen
- Während der Schwangerschaft oder der Stillzeit
- Bei Warzen, die ganz oder teilweise unter dem Nagel auftreten
- Die Warze max. einmal abtupfen und den Vorgang nach einer Woche nur wiederholen, wenn nötig.
- Auf Warzen anwenden, die komplett oder teilweise auf der Fußsohle auftreten (Dornwarzen)**

Verwenden Sie das Dr. Yglo Warzenmittel mit äußerster Sorgfalt:

- im Falle von Zweifeln an der Diagnose (die Veränderung der Haut kann nicht eindeutig als Warze identifiziert werden)
- bei Immunschwäche (z. B. wenn Sie Zytostatika einnehmen)
- bei Diabetes oder anderen Beschwerden wie Gefäßerkrankungen, aufgrund derer Wunden weniger gut heilen.

In diesen Fällen dürfen Sie das Dr. Yglo Warzenmittel nicht anwenden, bevor Sie einen Arzt konsultiert haben

⚠️ SONSTIGE HINWEISE

- Nur für die äußerliche Anwendung bestimmt
- Mit äußerster Vorsicht verwenden Die Flüssigkeit das Dr. Yglo Warzenmittels ist ätzend. Nicht einnehmen, nicht einatmen und den Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
- Wenn gesunde Haut mit der Flüssigkeit in Berührung kommt, die Haut mit Wasser abspülen. Wenn die Haut trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen gereizt wird, muss die Stelle wie eine Verbrennung behandelt werden.
- Bei Kontakt des Dr. Yglo Warzenmittels mit den Augen, die Augen einige Minuten lang behutsam ausspülen. Kontaktlinsen herausnehmen, falls vorhanden und möglich. Danach weiterspülen.
- Bei Einnahme oder Verschlucken des Dr. Yglo Warzenmittels, den Mund ausspülen. Erbrechen verhindern. Sofort den Vergiftungsnotruf Tel. 145 oder einen Arzt anrufen.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Ihre Beschwerden nicht nachlassen
- Die Flasche nach dem Gebrauch sorgfältig verschließen und aufrecht lagern
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Die Nutzung durch Kinder, ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten muss von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Kontakt mit Kleidung, Textilien, Tischtüchern oder der Haut vermeiden
- Bei Auftreten von Blasen die Anwendung abbrechen
- Die Warze max. einmal abtupfen und den Vorgang nach einer Woche nur wiederholen, wenn nötig

NEBENWIRKUNGEN
Das Dr. Yglo Warzenmittel kann einige Nebenwirkungen verursachen, die jedoch nicht in jedem Fall auftreten. Zu den Nebenwirkungen einer Anwendung des Dr. Yglo Warzenmittels gehören Hautreizungen, ein brennendes Gefühl, Hautrötungen und Überempfindlichkeit der Haut. Bei

schwerwiegenden Nebenwirkungen sowie Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder Ihre Apotheke.

WECHSELWIRKUNG VON MEDIKAMENTEN
Uns sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt.

PACKUNGSMATERIAL DES DR. YGLO WARZENMITTELS
Eine Flasche mit 2 ml einer Mischung aus Monochloressigsäure (50 %) und gereinigtem Wasser (50 %). Ein spezieller Applikator zum Auftragen der Formulierung auf die Warze.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN
Lagern Sie das Dr. Yglo Warzenmittel bei einer Temperatur von 15–25 °C an einem trockenen und dunklen Ort in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

 Das Verfallsdatum ist auf der Unterseite der Verpackung aufgedruckt. Nach dem Öffnen nicht länger als 4 Wochen verwenden.

Weitere Informationen zum Dr. Yglo Warzenmittel finden Sie unter www.drYglo.com. Wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt bitte an den Händler.

MEDIZINPRODUKT:
Das Dr. Yglo Warzenmittel ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der Richtlinie 93/42/EWG.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE
Die Warnzeichen und -symbole auf der Verpackung und der Gebrauchsanweisung sind wichtig, um zu garantieren, dass Sie dieses Produkt sicher und korrekt anwenden und um Sie und andere vor Verletzungen zu schützen. Die Symbole werden in der nachstehenden Tabelle erläutert:

Symbole	Explication
	Symbole du fabricant
	Symbole indiquant de consulter le mode d'emploi
	Symbole indiquant qu'il faut être prudent lors de l'utilisation du produit
	Symbole de la date d'expiration
	Symbole indiquant que l'article est un dispositif médical
	Avertissement : substance corrosive
	Ne convient pas aux enfants de 3 ans ou moins
	Tenir hors de portée des enfants
	Ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent
	Symbole du numéro de lot
	Le produit doit être conservé entre 15 °C et 25 °C

ANWENDUNG VON ACETOCAUSTIN WARZENMITTEL (AUFTRAGUNG NUR DURCH ERWACHSENE):

Bitte wenden Sie Acetocaustin Warzenmittel mit äußerster Vorsicht an. Die Lösung ist stark ätzend. Seien Sie besonders vorsichtig beim Auftragen auf schwer zugänglichen Bereichen Ihrer Hände und Füße. Dies gilt insbesondere für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder gestörter Feinmotorik (zitterige Hände, steife Finger).



1



2

Das Acetocaustin Warzenmittel hat einen kindersicheren Verschluss, der wie folgt geöffnet werden kann: Stellen Sie die Flasche auf einen festen Untergrund, der gegen die ätzende Flüssigkeit beständig ist. Vermeiden Sie den Kontakt mit Kleidung, Textilien und Tischdecken. Öffnen Sie die Flasche, indem Sie den Verschluss herunterdrücken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Vor dem Entfernen der Verschlusskappe Vaseline oder Zinksalbe großzügig auf die gesunde Haut um die Warze herum auftragen. Entfernen Sie die Verschlusskappe von der Flasche. Tragen Sie mit dem Spatel eine kleine Menge Acetocaustin Warzenmittel auf die Warze auf (lassen Sie die Flüssigkeit nicht heruntertropfen). Tragen Sie Acetocaustin Warzenmittel nur auf die Warze auf und betupfen Sie die Warze nur einmal. Lassen Sie die Lösung einen Moment lang trocknen und bedecken Sie die Warze nicht. Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch sorgfältig. Wenden Sie Acetocaustin Warzenmittel nicht häufiger als einmal pro Woche an.

Die Flüssigkeit benötigt eine Woche, um die oberste Schicht der Warze aufzulösen, sodass Sie nicht sofort nach der Anwendung ein Ergebnis sehen werden. Je nach Größe und Dicke der Warze kann es erforderlich sein, die Behandlung mit Acetocaustin Warzenmittel nach einer Woche zu wiederholen. Wiederholen Sie die Behandlung nicht innerhalb eines kürzeren Abstands als einer Woche.



ANWENDUNG NUR AUF HÄNDEN UND FÜßSEN

4+ JAHRE

2ml e

CE 0481





15 °C 25 °C

WARNUNG: UM VERBRENNUNGEN VORZUBEUGEN: LESEN SIE SICH VOR DER ANWENDUNG DIE GEBRAUCHSANWEISUNG

HERSTELLER
PK Benelux B.V.
Vluchttoord 17
5406 XP Uden
The Netherlands

LIEFERANT
TheOTClab
Fred.Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
The Netherlands